

Denna patientinformation har du fått från din läkare/sjuksköterska.

Mollipect®

BROMHEXIN / EFEDRIN

Frågor, svar och praktiska tips till
dig som ordinerats Mollipect



BioPhausia – en del av Karo Pharma AB

Mollipect®

– frågor, svar och praktiska tips

Förkylningssäsongerna avlöser varandra. Det finns många åtgärder som kan vidtas för att lindra hosta men ibland kan ett receptbelagt läkemedel såsom Mollipect® behövas. Här har vi tagit fram svaren på de vanligaste frågorna om Mollipect®, baserat på Mollipect produktresumé från 2017-04-05.

Är Mollipect lämplig medicin när man har hosta med slem?

Ja. Mollipect kan användas vid slemhosta. Mollipect innehåller ett ämne som anses göra slemmet i luftvägarna mer tunnflytande och därmed underlättar upphostningen. Förutom detta så innehåller Mollipect ett ämne som vidgar luftrören och verkar avsvällande på slemhinnorna.

Kan man ge hostmediciner så som Mollipect till en 2-åring som har jobbig hosta med segt slem?

Mollipect är godkänt för barn från 6 månaders ålder. Mollipect är receptbelagt och ska därför endast ges om det förskrivits av läkare. Följande doseringsinformation finns i FASS:

- » Vuxna och barn över 15 år: 15 ml 3-4 gånger per dygn
- » Barn 11-14 år: 10-15 ml 3 gånger per dygn.
- » Barn 6-10 år: 10 ml 3 gånger per dygn.
- » Barn 2-5 år: 5 ml 3 gånger per dygn.
- » Barn från 6 månader: 2,5 ml 3 gånger per dygn.

Hur många timmar ska det gå mellan intagen?

Doseringsanvisning för Mollipect gällande vuxna och barn över 15 år är 15 ml 3-4 gånger per dygn. Det innebär ett mellanrum mellan intag på 8 timmar (3 gånger per dygn) eller 6 timmar (4 gånger per dygn). Till barn under 15 år ges mindre mängder (se nedan) med ett intervall om 8 timmar.

Innehåller Mollipect mjölkprotein, laktos, äggprotein eller citrus?

Mollipect innehåller varken mjölk- eller äggprotein och inte heller laktos. Mollipect innehåller apelsinextrakt och bör därför undvikas vid citrusallergi.

Hur lång tid tar det innan Mollipect försvunnit ut kroppen?

Mollipect innehåller efedrin och bromhexin. Normalt tar det cirka 2-3 dygn för huvuddelen av båda innehållsämnen att utsöndras ur kroppen. Utsöndringen av efedrin är pH-beroende och kan variera mycket mellan olika personer, varför spärmängder kan uppmätas ända upp till 5 dygn efter intag.

Hur kan jag resa (per flyg) med Mollipect, det är ju en vätska?

Det är viktigt att Mollipectflaskan står upp då den annars kan läcka. Det finns inte några stabilitetsdata på att förvara Mollipect i annat än originalflaskan så den bör inte hållas över till en plastflaska eller dylikt. Patienten rekommenderas att höra med flygbolaget om möjligheten att få ha flaskan i handbagaget. Det är Läkemedelverket som reglerar vad som gäller när du ska resa med läkemedel, både till och från Sverige. Etiketten ska sitta kvar på flaskan för att kunna påvisa att Mollipect används för eget bruk. Se mer info på Läkemedelsverkets hemsida.

Ska medicinen omskakas eller inte?

Mollipect behöver inte omskakas.

Mitt barn tycker inte att Molipect smakar gott. Kan jag ge det tillsammans med något?

Molipect är smaksatt med mentol, blodapelsin och pepparmynta, och kan upplevas som bitter eller besk. Det finns inte någon data på att blanda Molipect med något varför det inte kan rekommenderas. Ett förslag är att ge något att dricka eller äta direkt efter att Molipect svalts. Det är viktigt att som förälder vara lugn och positiv vid tillfället och uppmuntra barnet så mycket som möjligt.

Varför ska man inte ta Molipect om man har grön starr?

Grön starr eller glaukom som det också kallas finns i två former, öppen-vinkelglaukom och trångvinkelglaukom. Molipect kan genom sitt innehåll av efedrin teoretiskt orsaka pupillvidgning, vilket kan utlösa trångvinkelglaukom hos personer med anlag för detta. Varningen som finns gäller således patienter med ökad risk för trångvinkelglaukom, vilken är den ovanliga formen av glaukom.

Vad kan hända om man tar Molipect och har något förhöjt blodtryck?

Efedrin kan påverka blodtrycket, särskilt hos personer med hjärtsjukdom. Har du högt blodtryck eller hjärtsjukdom ska du rådgöra med läkare innan du använder Molipect. Det kan vara bra att kontrollera blodtrycket något oftare under behandlingen.

Kan Molipect påverka blodsockret hos en diabetiker?

Ja. Efedrinet i Molipect kan öka utsöndringen av glukagon och minska utsöndringen av insulin, så energireserver frigörs och blodsockret stiger. Diskutera med din läkare om du har diabetes. Det kan vara bra att mäta blodsockret oftare för att kontrollera att det inte stiger.



Kan man ta Mollipect när man är gravid?

Läkaren sa att jag kunde ta medicinen, men på flaskan står det att man ska vara försiktig de tre första månaderna.

Studier såväl som klinisk erfarenhet har inte visat några negativa effekter under graviditet. Dock ska normal försiktighet vid användning av läkemedel under graviditet iakttas, speciellt under den första trimestern. Diskutera med behandlande läkare samt informera BioPhausia.

Kan man amma och ta Mollipect samtidigt?

Det finns inte några tillgängliga data rörande övergång av bromhexin och efedrin i bröstmjolk, så därför rekommenderas inte Mollipect vid amning.

Kan man dricka alkohol om man tar Mollipect?

Det är inte farligt att ta Mollipect tillsammans med normala mängder alkohol.

Hur mycket etanol innehåller Mollipect?

Mollipect innehåller etanol som lösningsmedel. Den innehåller 30 mg etanol/ml, vilket motsvarar cirka 0,1 ml 40% sprit. En dygnsförbrukning på 45-60 ml Mollipect till en vuxen ger 4,5-6 ml (dvs ca en tesked) sprit fördelat över dygnet, vilket kan anses som försumbara mängder.

Varför ingår inte Mollipect i högkostnadsskyddet?

Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som beslutar vilka läkemedel som ska ingå i förmånssystemet och de beslutade 2007 att hostmedicin som Mollipect inte ska ingå.

Jag undrar hur länge en öppnad hostmedicin håller?

En öppnad Mollipectflaska är hållbar till utgångsdatumet. Smaken kan dock ändras aningen vid lagring (mentol respektive pepparmyntsmakerna blir mer framträdande).





Om du har medicinska frågor kring Mollipect är du välkommen att kontakta **BioPhausias** Medicinska avdelning på tel 020-88 92 83 måndag-fredag 08.30-16.30 eller via mail på medinfo@biophausia.se

Mollipect (bromhexin, efedrin), Receptbelagt läkemedel.

Oral lösning med expektorande, bronkvidgande och slemhinneavsvällande effekt


Användning:

Mollipect används vid hosta med segt slem och samtidigt behov av luftrörsvidgande effekt.

Mollipect innehåller bromhexin och efedrin. Bromhexin anses göra slemmet i luftvägarna mer tunnflytande. Det kan underlätta upphostning av slem. Efedrin vidgar luftrören och verkar avsvällande på slemhinnorna. Till barn från 6 månaders ålder och äldre.

Varningar och försiktighet: Om du har blodiga upphostningar ska du kontakta läkare. Eftersom muntorrhet förekommer är det viktigt med noggrann munhygien (tandborstning med fluortandkräm 2 gånger per dag) under användning av Mollipect. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Mollipect och omedelbart kontakta läkare. Vid höga doser och långvarig användning finns viss risk för utveckling av beroende. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Vid behandling med Mollipect kan yrsel förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.

Läs bipacksedeln noga.



BioPhausia – en del av Karo Pharma AB

Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm | Tel: 010-330 23 10 | www.karopharma.se